

Récapitulons

Indications (stade de la plaie)	Classe de pansement utilisable	Rythme de renouvellement
<ul style="list-style-type: none"> •Plaies superficielles en cours d'épidermisation •Dermabrasion •Site donneur de greffe 	<ul style="list-style-type: none"> •Hydrocellulaire •Hydrocolloïde mince •Tulles/Interface •Film de polyuréthane •Acide hyaluronique 	48h - 1 semaine
Plaies bourgeonnantes	<ul style="list-style-type: none"> •Hydrocellulaire •Hydrocolloïde •Acide hyaluronique •Hydrofibre •Tulles/Interface 	48h - 72h
Plaies très exsudatives	<ul style="list-style-type: none"> •Alginate •Hydrofibre •Hydrocolloïde nouvelle génération 	24h
Plaies exsudatives	<ul style="list-style-type: none"> •Alginate •Hydrofibre •Hydrocellulaire 	24h - 48h
Plaies fibrineuses	<ul style="list-style-type: none"> •Alginate •Hydrofibre •Hydrocellulaire •Hydrocolloïde •Acide hyaluronique 	48h
Plaies fibrineuses sèches	<ul style="list-style-type: none"> •Hydrogel 	48h
Plaies nécrotiques (nécrose noire sèche)	<ul style="list-style-type: none"> •Hydrogel +++ (sous occlusion) •Hypergel (sous surveillance stricte) 	24h - 48h Quotidien
Plaies infectées	<p>Ne pas confondre odeur et plaie infectée+++</p> <ul style="list-style-type: none"> •Alginates •Hydrofibres •Pansement au charbon •ATB •Éviter antiseptiques et ATB locaux 	Variable